

NARCAN[®] (naloxone HCl) **NASAL SPRAY**

QUICK START GUIDE

Opioid Overdose Response Instructions

Use NARCAN Nasal Spray (naloxone hydrochloride) for known or suspected opioid overdose in adults and children.

Important: For use in the nose only.

Do not remove or test the NARCAN Nasal Spray until ready to use.

1 Identify Opioid Overdose and Check for Response

Ask person if he or she is okay and shout name.

Shake shoulders and firmly rub the middle of their chest.

Check for signs of opioid overdose:

- Will not wake up or respond to your voice or touch
- Breathing is very slow, irregular, or has stopped
- Center part of their eye is very small, sometimes called “pinpoint pupils”


Lay the person on their back to receive a dose of NARCAN Nasal Spray.



2 Give NARCAN Nasal Spray

Remove NARCAN Nasal Spray from the box.

Peel back the tab with the circle to open the NARCAN Nasal Spray.



Hold the NARCAN nasal spray with your thumb on the bottom of the plunger and your first and middle fingers on either side of the nozzle.




Gently insert the tip of the nozzle into either nostril.

- Tilt the person's head back and provide support under the neck with your hand. Gently insert the tip of the nozzle into **one nostril**, until your fingers on either side of the nozzle are against the bottom of the person's nose.



Press the plunger firmly to give the dose of NARCAN Nasal Spray.

- Remove the NARCAN Nasal Spray from the nostril after giving the dose.




3 Call for emergency medical help, Evaluate, and Support

Get emergency medical help right away.

Move the person on their side (recovery position) after giving NARCAN Nasal Spray.

Watch the person closely.

If the person does not respond by waking up, to voice or touch, or breathing normally another dose may be given. NARCAN Nasal Spray may be dosed every 2 to 3 minutes, if available.



Repeat Step 2 using a new NARCAN Nasal Spray to give another dose in the other nostril. If additional NARCAN Nasal Sprays are available, repeat step 2 every 2 to 3 minutes until the person responds or emergency medical help is received.

For more information about NARCAN Nasal Spray, go to www.narcannasalspray.com, or call 1-844-4NARCAN (1-844-462-7226).

NARCAN[®] (naloxone HCl) **SPRAY NASAL**

GUIA DE INICIO RÁPIDO

Instrucciones para responder a una sobredosis de opioides

Use NARCAN[®] (clorhidrato de naloxona) Spray Nasal para conocidas o presuntas sobredosis en adultos y niños.

Importante: Solo para uso nasal.

No remueva o pruebe NARCAN Spray Nasal hasta que esté listo para usarse.

1 Identifique la sobredosis de opioide y compruebe la respuesta

Pregúntele a la persona si está bien y que diga su nombre.

Sacuda los hombros y frote firmemente la mitad del pecho.

Verifique la presencia de signos de sobredosis de opioides si:

- La persona no despierta o responde a su voz o contacto
- La respiración es muy lenta, irregular, o se ha detenido
- La parte central de los ojos es muy pequeña, a veces denominadas "pupilas puntiformes"

Acueste a la persona sobre su espalda para recibir una dosis de NARCAN Spray Nasal.



2 Administre NARCAN Spray Nasal

SAQUE NARCAN Spray Nasal de la caja.

Despegue la pestaña marcada con un círculo para abrir NARCAN Spray Nasal.


Sostenga NARCAN Spray Nasal con el pulgar sobre la parte inferior del émbolo y los dedos índice y medio a cada lado del pulverizador.

Con suavidad, inserte la punta del pulverizador en cada fosa nasal.

• Inclíne la cabeza de la persona hacia atrás y sujete la parte posterior del cuello con su mano. Inserte suavemente la punta del pulverizador en **una de las fosas nasales** hasta que sus dedos, en cada lado del pulverizador, estén contra la base de la nariz de la persona.

Presione firmemente el émbolo para administrar la dosis de NARCAN Spray Nasal.

• Retire NARCAN Spray Nasal de la fosa nasal después de administrar la dosis.



3 Solicite ayuda médica de emergencia, evaluación y soporte

Busque ayuda médica de emergencia inmediatamente.

Coloque a la persona de costado (posición de recuperación) después de administrar NARCAN Spray Nasal.

Observe atentamente a la persona.

Si la persona no responde despertándose, ante la voz o el contacto, o respirando normalmente podrá administrarse otra dosis. NARCAN Spray Nasal puede aplicarse cada 2 o 3 minutos, si está disponible.

Repita el paso 2 usando un nuevo NARCAN Spray Nasal para administrar otra dosis en la otra fosa nasal. Si están disponibles otros envases de NARCAN Spray Nasal, repita el paso 2 cada 2 o 3 minutos hasta que la persona responda o se reciba asistencia médica de emergencia.

